

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, EPCLUSA voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleinen haittavaikutus aikuisilla on ihottuma. Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Lue pakkausselosteesta lisätietoa mahdollisista haittavaikutuksista ja ohjeet siitä, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Muut lääkevalmisteet ja EPCLUSA

Älä ota EPCLUSA-valmistetta, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- **rifampisiini** tai **rifabutiini** (infektioiden, mukaan lukien tuberkuloosin, hoitoon käytettäviä antibiootteja)
- **mäkikuisma** (masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste)
- **karbamatsiini, fenobarbitaali** tai **fenytoiini** (epilepsian hoitoon ja kohtausten estoon käytettäviä lääkkeitä).

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos käytät jotakin seuraavista mahahaavan, närästyksen tai refluksitaudin hoitoon käytettävistä lääkkeistä:

- **antacidit**, nämä valmisteet on otettava vähintään 4 tuntia ennen EPCLUSA-valmistetta tai 4 tuntia sen jälkeen
- **protonipumpun estäjät**, jos käytät näitä valmisteita, EPCLUSA on otettava ruoan kera ja 4 tuntia ennen protonipumpun estäjää
- **H₂-reseptorin salpaajat**, jos tarvitset suuria annoksia näitä lääkkeitä, lääkäri saattaa määrätä sinulle muuta lääkettä tai muuttaa käyttämäsi lääkkeen annosta.

Opas potilaille, jotka aloittavat EPCLUSA[®]-hoidon

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen EPCLUSA-hoidon aloittamista.



Gilead Sciences Finland Oy
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
Puh: 09 4272 6918

EPCLUSA-valmiste

EPCLUSA on lääke, jonka vaikuttavat aineet sofosbuviri ja velpatasviri on yhdistetty samaan tablettiin. Nämä vaikuttavat aineet estävät yhdessä kahden sellaisen proteiinin toiminnan, joita virus tarvitsee kasvaakseen ja lisääntyäkseen, minkä ansiosta infektio voi poistua elimistöstä pysyvästi.

EPCLUSA-valmistetta annetaan kroonisen (pitkäaikaisen) hepatiitti C -infektion hoitoon aikuisille ja vähintään 3-vuotiailla lapsille. Tämä esite sisältää tietoa aikuispotilaille ja koskee valmistetta vahvuudeltaan 400 mg/100 mg.

Suositeltu annos aikuisille on 1 EPCLUSA-tabletti kerran vuorokaudessa 12 viikon ajan.



Lääkkeen ottaminen on tärkeää

- ▶ On erittäin tärkeää, että hoitoa ei lopeteta kesken. Kokonainen kuuri antaa valmisteelle parhaat edellytykset parantaa hepatiitti C -infektio
- ▶ Niele tabletti kokonaisena ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Älä pureskele, murskaa tai puolita tablettia, sillä se maistuu hyvin karvaalta.



**Yksi tabletti
kerran päivässä**



**Voidaan ottaa ruoan
kanssa tai tyhjään mahaan**

Mitä tehdä, jos unohdat ottaa EPCLUSA-annoksen

On tärkeää, ettei yksikään annos tätä lääkettä jää ottamatta. Jos annos jää ottamatta, laske, kuinka kauan edellisestä EPCLUSA-annoksen ottamisesta on kulunut:

- ▶ Jos EPCLUSA-annoksen tavallisesta ottamisajankohdasta on kulunut **alle 18 tuntia**, ota annos mahdollisimman pian. Ota sitten seuraava annos tavalliseen aikaan
- ▶ Jos EPCLUSA-annoksen tavallisesta ottamisajankohdasta on kulunut **18 tuntia tai enemmän**, odota ja ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta lähes samaan aikaan).

Jos sinulla on pahoinvointia

- ▶ Jos oksennat **alle 3 tunnin sisällä** EPCLUSA-valmisteen ottamisesta, ota toinen annos
- ▶ Jos oksennat **yli 3 tunnin kuluttua** EPCLUSA-valmisteen ottamisesta, sinun ei tarvitse ottaa toista annosta. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

EPCLUSA ja raskaus

EPCLUSA-valmisteen vaikutuksia raskauden aikana ei tunneta. Jos olet raskaana, epäilet tai suunnittelet raskautta, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Hoitohenkilöstö neuvoo sinua ja kumppaniasi tehokkaan ehkäisymenetelmän valinnassa. Ehkäisytabletteja voi käyttää samaan aikaan EPCLUSA-valmisteen kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Lisätietoa on myös EPCLUSA-valmisteen pakkausselosteessa.

Hoitoaikojen yhteystiedot:.....